



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Это контагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.

Возбудителем АЧС является ДНК — содержащий вирус рода *Asfivirus* семейства *Asfarviridae*. Возбудитель устойчив во внешней среде, в почве возбудитель сохраняет жизнеспособность.

АЧС не представляет опасности для здоровья людей

В случае заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание — в течение 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной службы:

8 (4922) 77-16-79

Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области

8 (4932) 32-36-38

Служба ветеринарии
Ивановской области

8 (4942) 55-33-03

Управление ветеринарии
Костромской области

Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

г. Владимир,
ул. Ново-Гончарная, д. 2
8 (4922) 77-16-64

г. Кострома,
пр-кт Мира, д. 53А
8 (4942) 37-01-75

г. Иваново,
ул. Молодых Рабочих, д. 1
8 (4932) 93-95-91

ДЕЖУРНЫЙ
8 (910) 180-08-68

ЭЛ. ПОЧТА
rshn8@fsvps.gov.ru



Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

В Н И М А Н И Е АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- лихорадка (с повышением температуры тела до 41-42°C)
- угнетенное состояние
- нарушение гемодинамики (посинение или покраснение кожи ушей, живота, хвоста)

СОПРОВОЖДАЕТСЯ

Диареей, кровянистыми истечениями из носовой полости, клиническими судорогами, у супоросных свиноматок — абортами.



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- необходимо соблюдать требования Ветеринарных правил, утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства № 621 от 21.10.2020 и № 37 от 28.01.2021
- все животные, содержащиеся в хозяйстве, должны подлежать индивидуальной или групповой идентификации
- территория хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения посторонних лиц, транспортных средств и животных
- не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах, без ветеринарных сопроводительных документов
- не скармливать животным пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней
- производить утилизацию биологических отходов в установленных местах в соответствии с Ветеринарными правилами, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства № 626 от 26.10.2020
- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без выпаса и без доступа к животным других видов



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении
- прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур и других)
- прекратить вывоз с территории хозяйства продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов

ПЕРЕДАЕТСЯ при прямом контакте здоровых и больных животных, а также через зараженные вирусом корма, подстилки, транспортные средства при перемещении животных.



БЕШЕНСТВО

Это острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

В случае заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание — в течение 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной службы:

8 (4922) 77-16-79

Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области

8 (4932) 32-36-38

Служба ветеринарии
Ивановской области

8 (4942) 55-33-03

Управление ветеринарии
Костромской области

Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

г. Владимир,
ул. Ново-Гончарная, д. 2
8 (4922) 77-16-64

г. Кострома,
пр-кт Мира, д. 53А
8 (4942) 37-01-75

г. Иваново,
ул. Молодых Рабочих, д. 1
8 (4932) 93-95-91

ДЕЖУРНЫЙ
8 (910) 180-08-68

ЭЛ. ПОЧТА
rshn8@fsvps.gov.ru



Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

ВНИМАНИЕ БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ



ПРИЗНАКИ БЕШЕНСТВА

Продромальная стадия (от 12 часов до 3 суток)

- повышение чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям
- изменение и снижение аппетита
- нарушение зрения
- повышение температуры тела

Стадия возбуждения (от 3 до 4 суток)

- приступы агрессии
- расстройство чувствительности
- учащенные позывы к мочеиспусканию
- слюнотечение
- судороги
- слабость
- сужение зрачков
- затрудненное дыхание

Стадия параличей (до 4 суток)

- снижение или исчезновение болевой чувствительности
- понижение температуры тела
- слюнотечение
- паралич глотки, языка, мышц челюсти и конечностей

ВНИМАНИЕ!

При вывозе домашних питомцев из РФ в страны Европейского союза необходимо сдать тест на определение титра антител к вирусу бешенства.

Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело нормально». Инкубационный период от 14 до 60 дней.

СВОЕВРЕМЕННО ПРОВЕДЕННАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
ЖИВОТНЫХ В ВЕТЕРИНАРНОЙ
СТАНЦИИ – САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
ИСТОЧНИК – БОЛЬНЫЕ И
НАХОДЯЩИЕСЯ В ИНКУБАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫЕ.

Факторами передачи возбудителя бешенства являются:

- слюна больных восприимчивых животных
- трупы павших от бешенства восприимчивых животных
- материально-технические средства
- объекты внешней среды, контаминированные возбудителем



ВЛАДЕЛЬЦЫ ВОСПРИИМЧИВЫХ ЖИВОТНЫХ ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать требования ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства № 705 от 25.11.2020
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание
- изолировать подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также животных, находившихся в контакте, обеспечить изоляцию трупов
- выполнять требования специалистов госветслужбы и предоставлять восприимчивых животных для осмотра в соответствии с ветеринарным законодательством
- при подозрении на бешенство предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных за последние 60 дней

**В ОСНОВНОМ БЕШЕНСТВО
ПЕРЕНОСЯТ ЛИСЫ, СОБАКИ,
ЕНОТЫ, БЕЛКИ, ЕЖИ,
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ**



ГРИПП ПТИЦ

Это остропротекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

В случае заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание — в течение 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной службы:

8 (4922) 77-16-79

Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области

8 (4932) 32-36-38

Служба ветеринарии
Ивановской области

8 (4942) 55-33-03

Управление ветеринарии
Костромской области

Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

г. Владимир,
ул. Ново-Гончарная, д. 2
8 (4922) 77-16-64

г. Кострома,
пр-кт Мира, д. 53А
8 (4942) 37-01-75

г. Иваново,
ул. Молодых Рабочих, д. 1
8 (4932) 93-95-91


ДЕЖУРНЫЙ
8 (910) 180-08-68

ЭЛ. ПОЧТА
rshn8@fsvps.gov.ru



Управление Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям

ВНИМАНИЕ ГРИПП ПТИЦ





МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- соблюдение режима хозяйства закрытого типа
- завоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных источников
- ввоз и вывоз птицы только при наличии ветеринарных сопроводительных документов



Высокопатогенный грипп птиц способен размножаться практически в любом органе птицы-хозяина.

Низкопатогенный обычно ограничивается дыхательными путями и желудочно-кишечным трактом.

Вирус может передаваться при прямом контакте с выделениями зараженных птиц, особенно через фекалии или при употреблении зараженных кормов и воды.

Переносчиками инфекции являются дикие птицы (водоплавающие — гуси, утки), которые практически не болевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния.

Среди домашних птиц к гриппу восприимчивы куры, индюки, перепела. После заражения развиваются тяжелые клинические проявления заболевания и летальный исход. За несколько дней смертность может приблизиться к **100%**.

**ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
У ОТДЕЛЬНОЙ ПТИЦЫ — 1-3 ДНЯ,
В СТАЕ — 14 ДНЕЙ.**

**В БОЛЬШОЙ СТАЕ БОЛЬНУЮ ПТИЦУ
МОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ, УЧИТЫВАЯ
ОЖИДАЕМЫЙ ПРИВЫЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИЛИ СМЕРТНОСТИ.**

Необходимо соблюдать требования Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.03.2021 № 158.

ПРИЗНАКИ ГРИППА ПТИЦ



- снижение яйценоскости
- дискоординация движений
- искривление шеи
- отсутствие реакции на внешние раздражители
- угнетенное состояние
- почернение гребня и сережек
- хриплое затрудненное дыхание
- подкожные геморрагии (кровоизлияния) на конечностях



Грипп птиц может передаваться от птицы к человеку при условиях высокой концентрации.

**! ОТ ЧЕЛОВЕКА
К ЧЕЛОВЕКУ
● НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ**

